

Nasometin ^[1]

Footnotes:

Zdroje:

1. Písomná informácia pre používateľa Nasometin, august 2018
2. Hrubíško M. Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest. *Via pract.*, 2016, 13(3): 102–105
3. Meltzer Eli.O et al. Burden of allergic rhinitis: Allergies in America, Latin America, and Asia-Pacific adult surveys. *Allergy and Asthma Proceedings*, Volume 33, Supplement 1, September/October 2012, pp. S113-S141(29)
4. Brooks M. Allergic rhinitis a significant burden. <http://www.medscape.com/viewarticle/739928> ^[2]. Published March 30, 2011.
5. ?ižnár P. Alergická rinitída a možnosti jej liečby. *Pediatr. prax*, 2009, 10 (2): 66-7.
6. Súhrn charakteristických vlastností lieku Nasometin, august 2018
7. Weiner JM et al. Intranasal corticosteroids versus oral H1 receptor antagonists in allergic rhinitis: systematic review of randomised controlled trials. *BMJ* 1998; 317(7173): 1624-9.

Nasometin

Senná nádcha (sezónna alergická nádcha) , ktorá sa objavuje v určitých obdobiach roka, je alergická reakcia spôsobená vdychovaním peľu zo stromov, tráv, burín a tiež plesní a spór húb.¹

Viete, že?

- Približne každý piaty Slovak trpí alergickou nádchou?²
- So sezónnou alergickou nádchou sú spojené nielen fyzické symptómy (upchatý nos, svrbenie a kýchanie, začervenanie a slzenie očí, bolesti hlavy), ale ovplyvňuje aj duševný stav (únava, podráždenosť, depresívna nálada, poruchy spánku) a znižuje kvalitu života (obmedzenie pobytu vonku a spoločenských aktivít, kontakt s domácimi zvieratami, pokles produktivity)?^{2,3,4}
- Nedostatočne liečená sezónna alergická nádcha môže prejsť do chronickej fázy, viesť k nižšiemu prahu citlivosti pacienta pri opätovnom kontakte s alergénom, k zosilneniu prejavu symptómov a k rozvoju zápalu aj v dolných dýchacích cestách (astma).⁵

Nasometin®

50 mikrogramov/dávku, nosová suspenzná aerodisperzia, ŠUKL kód: 8602C (balenie 1x10 g/60 dávok) voľnopredajný liek

Nasometin - dobrá voľba pre liečbu sezónnej alergickej nádchy

- S preukázaným klinickým účinkom proti sezónnej alergickej nádche, pôsobí protialergicky a protizápalovo^{6,7}
- Znižuje opuch a podráždenie v nose a zmierňuje kýchanie, svrbenie, a pocit upchatého nosa alebo nádchu, zapríčinené sennou nádchou¹
- Aplikuje sa len 1x denne¹
- Neovplyvňuje pozornosť⁶

Obsahuje mometazónfuroát. Na použitie do nosa. Pred začatím používania lieku si pozorne prečítajte priloženú písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Image not found or type unknown



Viac informácií si prečítajte tu :

[Nasometin_PIL_OTC.pdf \(PDF 356.04 KB\)](#) ^[3]

Source URL: <https://www.sandoz.sk/otc/nasometin>

Links

[1] <https://www.sandoz.sk/otc/nasometin>

[2] <http://www.medscape.com/viewarticle/739928>

[3] https://www.sandoz.sk/sites/www.sandoz.sk/files/documents/Nasometin_PIL_OTC.pdf